

北京博飞教育中心独家奉献

一、 选择题

1 C 2 B 3 C 4 C 5 B 6 D 7 A 8 C 9 D 10 C

11 B 12 B 13 B 14 A 15 D 16 A 17 A 18 A 19 C 20 B

二、 填空题

21 太平 西北 东北 菲律宾 韩国 日本

22 英吉利海峡 直布罗陀海峡 马六甲海峡 霍尔木兹海峡（以上答出其中三个即可）白令海峡 德雷克海峡

23 阿拉斯加 夏威夷 加拿大 墨西哥

24 额尔齐斯 天 伊犁 哈萨克斯坦 巴尔喀什

三、 读图、 填图题：

25 (1) 东亚（亚洲东部） 北美 西欧（欧洲西部） (2) 伦敦 东京

26 (1) 温带海洋性 亚寒带针叶林（温带大陆性）

(2) 热带雨林 热带（稀树）草原 亚热带硬叶林

27 几内亚 刚果 尼日利亚 石油 本格拉寒流

28 丽江 攀枝花 二滩 洱海

四、 综合题

29 (1) （每项 2 分，共 10 分） 苔原（带） 亚寒带针叶林（带）

温带落叶阔叶林和针阔混交林（带） 亚热带绿阔叶林（带）

热带雨林带

(2) （共 6 分） 导致自然带纬度地带性分布的主导因素是热量（太阳辐射）（3 分）

导致自然带东西向经度地带性分布的主导因素是水分距海远近（3 分）

30 （14 分）

(1) （共 8 分） 因纬度低热量丰富和降水丰沛（2 分） 具有发展热带经济作物的优势（2 分）； 热带海洋景观（2 分） 为旅游业的发展提供了良好的条件（2 分）

(2) （共 6 分） 导致甲地降水量少于乙地的主要原因是： 岛屿中部有五指山（山地）（3 分）， 雨季主导风向为偏东风， 甲地处于背风坡（雨影区）， 故少雨（3 分）